

Link do produktu: <https://eogrodnicy24.pl/florovit-1kg-do-borowek-p-412.html>

FLOROVIT 1KG DO BORÓWEK.

Cena	15,80 zł
Dostępność	Produkt dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	04337
Kod EAN	5900861142107
Producent	Brak

Opis produktu

Wieloskładnikowy, mineralny nawóz doglebowy, przeznaczony do pogłównego dokarmiania borówek w pierwszym roku po posadzeniu i w dalszych latach uprawy. Ważną zaletą Florovitu pod borówki jest zdolność zakwaszania gleby, co wyraźnie sprzyja wzrostowi i rozwojowi roślin wymagających stanowiska o niskim odczynie podłoża. Cechuje go również brak azotanów. Borówki sadi się jesienią w podłoże o pH 3,8 - 4,8. Rośliny uprawiane w podłożu o zbyt wysokim odczynie charakteryzują się małymi przyrostami oraz przedwczesnym żółknięciem i opadaniem liści. Nawóz zapobiega chlorozie liści w okresie wegetacji roślin. Ponadto zastosowano w nim słabo przemieszczające się w glebie formy składników pokarmowych, co zabezpiecza je przed wymywaniem do wód gruntowych.

Sposób stosowania:

Borówki. Dokarmianie pogłównie rozpoczyna się wiosną na początku wzrostu roślin, czyli zwykle w połowie kwietnia. Drugie i trzecie nawożenie należy przeprowadzić każdorazowo po upływie kolejnych czterech tygodni. Zasilanie roślin zaleca się zakończyć do 15 czerwca. Nawóz po rozsypaniu wokół rośliny należy delikatnie wymieszać z glebą. Zalecane jest także podlanie roślin. Dawki: pierwszy rok po posadzeniu - trzy razy po 20 g/m² łącznie 60 g/rok; dalsze lata uprawy - trzy razy po 30-35 g/m² łącznie ok. 100 g/rok.

Różaneczniki. Podobnie jak pod borówkę stosuje się przedwegetacyjnie przy sadzeniu na 1 roślinę 25-50 g nawozu (mieszając go z 25-50 l ziemi z dołka) zaś w następnych latach nawóz rozsiewa się pod koronę wczesną wiosną: w 1 roku w marcu ok. 20 g i w kwietniu ok. 20 g; w 2 roku w marcu ok. 25 g i w kwietniu ok. 25 g; w dalszych latach w marcu ok. 30 g i w kwietniu ok. 30 g.

Azalie i wrzoście. Przedwegetacyjnie mieszamy z ziemią, do której sadi się roślinę, ~ 10 g nawozu na 10 l ziemi. W następnych latach, wczesną wiosną (kwiecień) rozsiewa się pod koronę na powierzchnię ziemi ok. 10 g nawozu i obficie podlewa. W przypadku większych roślin (3-4 lata i starszych) nawożenie powtarza się po 2-3 miesiącach w takiej samej dawce. W uprawie pojemnikowej w przeliczeniu na litr podłoża nie należy przekraczać dawki 1 g nawozu.

Paprocie i iglaki. Rośliny te można nawozić Florovitem pod borówki przedwegetacyjnie i pogłównie, jeśli gleba jest za mało kwaśna - pH gleby powyżej 6. Przedwegetacyjnie w przeliczeniu na 1 roślinę rozsiewa się jednorazowo i miesza z glebą ok. 10 g nawozu z 10-20 l gleby. W następnych latach jednorazowo rozsiewa się pod koronę wczesną wiosną ok. 10 g nawozu. Pod iglaki dawkę pogłówną nawozu uzależnia się od wieku rośliny: zwiększa się ją do 20 g, gdy roślina osiąga 0,5 m wysokości; do 40 g, gdy roślina osiąga 1 m wysokości; do 60 g, gdy roślina osiąga 2 m wysokości. Jedna łyżka stołowa zawiera średnio 10 g nawozu.

ULOTKA

Skład nawozu:

Zestawienie zawartości składników pokarmowych nawozu dostępne w [tabeli](#).

Termin stosowania:

- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- X
- XI
- XII

Dostępne gramatury:

Worek 1 kg.