

Link do produktu: <https://eogrodniczy24.pl/florovit-3kg-p-brazowieniu-igiel-p-372.html>

FLOROVIT 3KG P/BRAZOWIENIU IGIEŁ

Cena	38,20 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	04341
Kod EAN	5900861242371
Producent	Brak

Opis produktu

Florovit nawóz przeciwko brązowieniu igieł

Najczęstszą przyczyną obumierania drzew iglastych jest niedobór składników pokarmowych. Po pewnym czasie od posadzenia następuje zmiana koloru igieł do jasnozielonego, następnie żółtego, w końcu igły brunatnieją i opadają, a drzewo obumiera. Opisane objawy nie są spowodowane przez szkodniki. Są to skutki niewłaściwego zaopatrzenia w składniki pokarmowe - najczęściej występuje niedobór magnezu. Ponieważ przyswajalność składników z gleby zmniejsza się bardzo w glebie suchej, opisane objawy niedoboru najczęściej widoczne są w okresach suszy. Niedoborom tym można zapobiegać poprzez dostarczenie drzewom magnezu, zarówno w drodze nawożenia doglebowego, jak również dokarmiania dolistnego.

Sposób stosowania:

Zalecaną dawkę nawozu rozsypać równomiernie pod koronę drzew lub krzewów. Następnie należy rośliny obficie podlać. Nawóz można stosować przez cały rok w miarę potrzeb. Szczególnie wskazane jest stosowanie nawozu w momencie pojawienia się pierwszych objawów brunatnienia igieł. Nawóz można stosować również w formie oprysków dolistnych. Do tego zabiegu zaleca się około 5% roztwór nawozu (500 g nawozu na 10 l wody). Przy silnym niedoborze zabieg ten należy powtórzyć 2 - 3 razy w odstępach 14-dniowych.

Wielkość drzewa lub krzewu

do 1 m
od 1 m do 2 m
od 2 m do 5 m
od 5 m do 10 m
powyżej 10 m

Zalecana dawka

25 g/m²
50 g/m²
100 g/m²
150 g/m²
200 g/m²

Nawóz polecany jest także pod wszystkie rośliny, u których występuje ryzyko niedoboru magnezu. Przedwegetacyjnie: dawkę jednorazową 25 g/m² powierzchni uprawnej należy wymieszać z co najmniej 10-centymetrową warstwą gleby. Poglównie: dawkę jednorazową 10 g/m² powierzchni uprawnej należy stosować posypowo lub dolistnie, opryskując rośliny 5% roztworem przy zużyciu 50-100 ml cieczy użytkowej na 1 m² powierzchni uprawnej. Jedna łyżka stołowa zawiera średnio 15 g nawozu.

Skład nawozu:

Zestawienie zawartości składników pokarmowych nawozu dostępne w [tabeli](#).

Termin stosowania:

- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- X
- XI
- XII

Dostępne gramatury:

Worek 3 kg.