Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 22:56

Link do produktu: https://eogrodniczy24.pl/florovit-3kg-p-brazowieniu-igiel-p-372.html



FLOROVIT 3KG P/BRĄZOWIENIU IGIEŁ

Cena	**38,20 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**04341**
Kod EAN	**5900861242371**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Florovit nawóz przeciwko brązowieniu igieł

Najczęstszą przyczyną obumierania drzew iglastych jest niedobór składników pokarmowych. Po pewnym czasie od posadzenia następuje zmiana koloru igieł do jasnozielonego, następnie żółtego, w końcu igły brunatnieją i opadają, a drzewo obumiera. Opisane objawy nie są spowodowane przez szkodniki. Są to skutki niewłaściwego zaopatrzenia w składniki pokarmowe - najczęściej występuje niedobór magnezu. Ponieważ przyswajalność składników z gleby zmniejsza się bardzo w glebie suchej, opisane objawy niedoboru najczęściej widoczne są w okresach suszy. Niedoborom tym można zapobiegać poprzez dostarczenie drzewom magnezu, zarówno w drodze nawożenia doglebowego, jak również dokarmiania dolistnego.

Sposób stosowania:

Zalecaną dawkę nawozu rozsypać równomiernie pod koroną drzew lub krzewów. Następnie należy rośliny obficie podlać. Nawóz można stosować przez cały rok w miarę potrzeb. Szczególnie wskazane jest stosowanie nawozu w momencie pojawienia się pierwszych objawów brunatnienia igieł. Nawóz można stosować również w formie oprysków dolistnych. Do tego zabiegu zaleca się około 5% roztwór nawozu (500 g nawozu na 10 l wody). Przy silnym niedoborze zabieg ten należy powtórzyć 2 - 3 razy w odstępach 14-dniowych.

Wielkość drzewa lub krzewu	**Zalecana dawka**
do 1 m	25 g/m^2
od 1 m do 2 m	50 g/m^2
od 2 m do 5 m	100 g/m^2
od 5 m do 10 m	150 g/m^2
powyżej 10 m	200 g/m^2

Nawóz polecany jest także pod wszystkie rośliny, u których występuje ryzyko niedoboru magnezu. Przedwegetacyjnie: dawkę jednorazową 25 g/m^2 powierzchni uprawnej należy wymieszać z co najmniej 10-centymetrową warstwą gleby. Pogłównie: dawkę jednorazową 10 g/m^2 powierzchni uprawnej należy stosować posypowo lub dolistnie, opryskując rośliny 5% roztworem przy zużyciu 50-100 ml cieczy użytkowej na 1 m^2 powierzchni uprawnej. Jedna łyżka stołowa zawiera średnio 15 g nawozu.

Skład nawozu:

Zestawienie zawartości składników pokarmowych nawozu dostępne w tabeli.

Termin stosowania:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Dostępne gramatury:

Worek 3 kg.